Blessé(s) sur site d'engagement — H0

SAFE xABC — Dans les 10 min

MARCHE RYAN — Dans l'heure

Ce qui fait mal: Blessures, garrots, gestes, brancardage, vibrations, frissons, ….. — Chirurgie — Dans les 02h00

SC1

SC1/SC2

SC1/SC/SC3

Brancardage | Brancardage | Vibrations

Mise à l'abri — Tri — Point de regroupement — Tri — Point d'évacuation — Tri — MEDEVAC

*Parler/informer/expliquer/ Documenter ce qui est fait sur la FMA. **M** ou un **K** avec horaire **sur la joue** du combattant*

Posture — *Immobilisation des fractures – Installation dans le vecteur d'évacuation*

A E P E

Morphine 10 mg/sc
Oxycodone 5-10 mg/ os
Ketamine IN 0,5-1mg/kg
Délai : 15-30 min

EVN≥4

Ketamine IN 1/2 dose /15 min Max x8
Morphine 10 mg S/C /30 min

EVN≥4

- *Morphine IV Titration – 1 mg/ml*
- *Bolus 3mg IVD/5 min . Dose Max =3*
- *Si EVN≥4 Kétamine IV 0,2mg/kg*

Penthrox. Inhalation 3 ml Max 2 flacons
Commence à agir au bout de 6 inhalations
Effet max en 15 min

ALR :Surtout Ilio-fascial, 3/1, bloc costal

Analgésie multimodale pour + d'efficacité et – de complications

Refroidissement brûlures - Eau tempérée 20°C (règle 3x20 ?) – Pas le blessé

Réchauffer pour prévenir les frissons en rapport avec une hypothermie

*CoAntalgie : **1.** Paracétamol – AINS IV/per os **2.** Lidocaïne IV **3.** Dexamethasone IV*

Sédation procédurale: Midazolam 1 mg+[Kétamine 10-20 mg IV /3 min] qsp sédation OK*

Battlefield Acupuncture/Acupressure ?

Analgésie à l'avant

Indication

EVN≥4

Objectif

EVN < 4

-~~A V P U~~
-Pouls radial +
-Fr≥10
-SpO2≥ 90 %



Gérer les effets secondaires

Pouls radial bilatéral non/mal perçu
-STOP
-Adré titré 1 amp/20ml cc/cc=0,05 mg
-Si PSE: NAD 0,1mg/ml 5ml/h puis ↑ titrée

FR<10: STOP, Stimuler, O2
- Naloxone 1 amp 0,4mg/10ml
- Titration IV: 2,5ml = 0,1mg qps FR>12

~~A V P U~~ Somnolence, Vertige : **STOP**

Nausées, Vomissements. SI dispo:
- Dexamethasone 4mg/1ml : 1 amp IVD

SI échec : Sufenta IN A utiliser pur
- 0,5µg/kg - 0,01mL/kg
- MAX 0,5ml soit 50µg par narine

Percuter la syrette de Morphine	* Recours au midazolam pas consensuel – Réservé personnel formé	Attention aux allergies	Attention aux dilutions	"Petit" poids = "Petite" dose